



## DISBIOSI TEST

### TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA DISBIOSI INTESTINALE

#### PREPARAZIONE

Nei 7 giorni che precedono l'esame, il paziente deve evitare l'assunzione di cortisonici ed antinfiammatori.

#### ESECUZIONE

1. Raccogliere un campione di urina, la seconda della giornata;
2. Prelevare dal contenitore dell'urina un campione, utilizzando la pipetta inclusa nel kit;
3. Depositare l'urina della pipetta all'interno della "provetta invio campione";
4. Inserire la "provetta invio campione" all'interno della provetta di sicurezza e chiudere quest'ultima.

#### INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

È quantificata la presenza nelle urine di due metaboliti del triptofano: lo **Scatolo** e l'**Indicano**.

a) **Scatolo positivo:**

Disbiosi putrefattiva localizzata nel crasso (il sintomo guida è la stipsi).

b) **Indicano positivo:**

Disbiosi fermentativa localizzata nel tenue (il sintomo guida è il gonfiore).

In condizioni normali l'Indicano e lo Scatolo sono sostanze presenti nelle urine soltanto in tracce.

In condizioni patologiche, invece, la loro concentrazione aumenta, superando un valore soglia.

Livello di Disbiosi:

1. Lieve: 10-20 mg/l
2. Media: 20-40 mg/l
3. Grave: 40-60 mg/l

#### CONSIGLI PER IL PAZIENTE

Nel caso in cui il livello di Scatolo risulta grave, si consiglia di procedere con l'integrazione di ceppi **Bifidobatteri**.

Nel caso in cui il livello di Indicano risulta grave, si consiglia di procedere con l'integrazione di ceppi **Lattobacilli**.

Nel caso in cui sia il livello di Scatolo che di Indicano risultano gravi, si consiglia l'integrazione di entrambi i ceppi nominati precedentemente.

In caso di positività, si consiglia di ripetere il test dopo 3/4 mesi per valutare la normalizzazione dei valori di Indicano e Scatolo, in seguito ad un adeguato trattamento.

Via Vescovado, 26  
84014 Nocera Inferiore (SA)  
tel. 081 51 77 334 | info@salusnocera.it  
P. IVA IT00279600647